

文章编号: 1000-5013(2008)03-0459-05

C^n 空间中具有非光滑边界强拟凸域上 Koppelman-Leray-Norguet 公式的拓广式

李志伟¹, 陈特清²

(1. 泉州师范学院 数学系, 福建 泉州 362000; 2. 厦门大学 数学科学学院, 福建 厦门 361005)

摘要: 利用 Laurent-Thiebaut 等引进的 \mathbb{R}^n 流形, 构造拓广的 B-M (Bochner-Martinelli) 新核, 探究 C^n 空间中具有非光滑边界强拟凸域上 Koppelman-Leray-Norguet 公式的拓广式和 $\bar{\partial}$ -方程的连续解. 其结果的特点是不含边界积分, 从而避免了边界积分的复杂估计.

关键词: 强拟凸域; 非光滑边界; Koppelman-Leray-Norguet 公式; 拓广式; $\bar{\partial}$ -方程
中图分类号: O 174.56 文献标识码: A

早在 1831 年, Cauchy 发现了以其名字命名的 Cauchy 积分公式, 数学家就认识到积分表示在复分析中的重要性. 自从 20 世纪 70 年代 Henkin^[1-2] 和 Grauert 等^[3] 分别得到了 C^n 空间中强拟凸域的 $\bar{\partial}$ -方程的解的积分公式后, 多复变数的积分表示方法迅速发展起来, 成为多元复分析的主要方法之一, 它的主要优点是如单变数的 Cauchy 积分公式一样便于估计. Koppelman^[4] 于 1967 年得到了 C^n 空间中 $(0, q)$ 型微分形式的 Koppelman 公式. 有关 C^n 空间中 $(0, q)$ 型微分形式的积分表示理论取得一些成果^[5-8], 姜永^[9] 得到 C^n 空间中具有逐块光滑边界有界域上连续有界 $(0, q)$ 型微分形式的一种抽象的积分表示和 $\bar{\partial}$ -方程的连续解. 本文在此基础上利用 Laurent-Thiebaut 等^[10] 引进的 \mathbb{R}^n 流形, 构造拓广的 B-M 新核, 研究了 C^n 空间中具有非光滑边界强拟凸域上 Koppelman-Leray-Norguet 公式, 得到其拓广式和 $\bar{\partial}$ -方程的连续解. 文中所采用的记号与文[10-12] 同.

1 基本知识和引理

设 $D \subset C^n$ 具有非光滑边界强拟凸域, ρ_k 为 S_k 的某一邻域 θ_k 的强多次调和 C^2 函数, 使得

$$D \cap \theta_k = \{z \in \theta_k; \rho_k(z) < 0\}, \quad k = 1, 2, \dots, N.$$

S_1, \dots, S_N 恰构成 D 的边界, 记 $N(\rho_k) = \{z \in \bar{U}_k; \rho_k(z) = 0\}$ ($k = 1, \dots, N$). 设 $N(\rho_k) \subset \cup U_k$ ($k = 1, \dots, N$), 因此, 可以用 $\theta_k \subset \cup U_k$ 来记 $N(\rho_k)$ 的邻域. 由文[5] 中的定理 4.8.3 和引理 4.8.2, 并假设经过适当放缩 θ_k , 可以找到常数 $\epsilon > 0, \alpha > 0$, 以及定义在 $z \in D \cup \theta_k, \zeta \in \theta_k, C^1$ 的函数 $\Phi_k(z, \zeta)$ 和 $\Phi_k(z, \zeta)$ 满足下列条件.

(I) $\Phi_k(z, \zeta), \Phi_k(z, \zeta)$ 关于 $z \in D \cup \theta_k$ 全纯, 关于 ζ 是 C^1 连续的.

(II) 当 $z \in D \cup \theta_k, \zeta \in \theta_k$, 且 $|z - \zeta| \geq \epsilon$ 时, 有

$$\Phi_k(z, \zeta) \neq 0, \quad \Phi_k(z, \zeta) \neq 0; \quad (1)$$

当 $z \in D \cup \theta_k, \zeta \in \theta_k$, 且 $|z - \zeta| \leq \epsilon$ 时, 有

$$|\Phi_k(z, \zeta)| \geq \alpha(\rho_k(\zeta) - \rho_k(z) + |z - \zeta|^2), \quad (2)$$

收稿日期: 2007-10-03

作者简介: 李志伟(1965-), 男, 副教授, 主要从事多复变函数的研究. E-mail: wei2785801@qztc.edu.cn.

基金项目: 国家自然科学基金资助项目(10771144)

$$|\Phi_k(z, \zeta)| \geq \alpha(-\rho_k(\zeta) - \rho_k(z) + |z - \zeta|^2). \tag{3}$$

对每个 $z \in \theta_k$ 有

$$\Phi_k(z, z) = 0. \tag{4}$$

(III) 当 $\zeta \in N(\rho_k), z \in D \cup \theta_k$ 时, 有

$$\Phi_k(z, \zeta) = \Phi_k(z, \zeta). \tag{5}$$

由文[5]中推论 4.9.4 并适当放缩 θ_k , 可找到 $T^*(C^n)$ 值 C^1 映射 $s_k^*(z, \zeta)$ 满足下列条件.

(IV) $s_k^*(z, \zeta) \in T_z^*(C^n), z \in D \cup \theta_k, \zeta \in \theta_k, k=1, \dots, N.$

(V) $s_k^*(z, \zeta)$ 关于 $z \in D \cup \theta_k$ 全纯, $k=1, \dots, N.$

(VD) $\Phi_k(z, \zeta) = \langle s_k^*(z, \zeta), \zeta - z \rangle, z \in D \cup \theta_k, \zeta \in \theta_k, k=1, \dots, N.$

对在 $D \times S_K \times \Delta_{0,k}$ 的某一邻域 $\mathcal{D} \times M \times \Delta_{0,k}$ 的所有使得 $\langle s_k^*(z, \zeta), \zeta - z \rangle \neq 0$ 的 (z, ζ) , 定义

$$E_\alpha^{(m)} = \lambda_0 g_\alpha^{(m)} + \sum_{k \in K} \lambda_k \frac{P_\alpha^{(k)}(\zeta, z)}{\Phi_k(\zeta, z)}, \quad \alpha = 1, 2, \dots, k, n$$

$$\text{上式中, } g_\alpha^{(m)} = \frac{(\bar{\zeta}_\alpha - \bar{z}_\alpha) |\zeta_\alpha - z_\alpha|^{m-2}}{\sum_{j=1}^n |\zeta_j - z_j|^m}, \quad m=2, 3, \dots.$$

当 ζ 固定时, $P_\alpha^{(k)}$ 关于 $z \in D$ 全纯; 而当 z 固定时, $P_\alpha^{(k)}$ 关于 $\zeta \in \mathcal{D}$ 连续, 且满足

$$\Phi_k(z, \zeta) = \sum_{\alpha=1}^n P_\alpha^{(k)}(z, \zeta) (\zeta_\alpha - z_\alpha), \quad z \in D \cup \theta_k, \zeta \in \theta_k, k=1, \dots, N. \tag{6}$$

由 s_k^* 的性质可知, 映射 $(z, \zeta, \lambda) \mapsto E_\alpha^{(m)}$ 在 $D \times \partial D \times \Delta$ 的某一邻域 $\mathcal{D} \times M \times \Delta$ 上, 定义了一个 C^1 函数.

由微分式 $\Omega(E^{(m)}) = \frac{(n-1)!}{(2\pi i)^n} \left(\sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} E_k^{(m)} \bar{\partial} E_1^{(m)} \wedge \dots \wedge [k] \wedge \dots \wedge \bar{\partial} E_n^{(m)} \right) \wedge d\zeta$ 在 $D \times \partial D \times \Delta$ 的某一邻域 $\mathcal{D} \times M \times \Delta$ 上是连续的, 其中, $\bar{\partial} = d\lambda + \bar{\partial}_z + \bar{\partial}_\zeta$, 符号 $[k]$ 表示第 k 项缺失. 对于 C^n 中具有逐块 C^1 边界的强拟凸域, 文[9]证明了下述结论.

引理1^[2] 设 f 为一具有逐块 C^1 光滑边界的强拟凸域 $D \subset C^n$ 上的 $(0, q)$ 型微分形式, $f \in C_{(0,q)}(\bar{D})$, $\bar{\partial} f$ 也在 \bar{D} 连续, $1 \leq q \leq n$, 那么有

$$(-1)^q f(z) = \bar{\partial}_z \left[\sum_{|K| \leq n-q} (-1)^{|K|} \int_{S_K \times \Delta_{0,K}} f(\zeta) \wedge \Omega(E^{(m)}) + \int_{D \times \Delta_0} f(\zeta) \wedge \bar{\omega}^{(m)}(\zeta - z, \bar{\zeta} - \bar{z}) - \left[\sum_{|K| \leq n-q} (-1)^{|K|} \int_{S_K \times \Delta_{0,K}} \bar{\partial}_\zeta f(\zeta) \wedge \Omega(E^{(m)}) + \int_{D \times \Delta_0} \bar{\partial}_\zeta f(\zeta) \wedge \bar{\omega}^{(m)}(\zeta - z, \bar{\zeta} - \bar{z}) \right] \right]. \tag{7}$$

上式中, $\bar{\omega}^{(m)}(\zeta - z, \bar{\zeta} - \bar{z}) = \frac{(n-1)!}{(2\pi i)^n} \left(\frac{m}{2} \right)^{n-1} \left[\frac{\prod_{j=1}^n |\zeta_j - z_j|^{m-2} \sum_{\alpha=1}^n (-1)^{\alpha-1} (\bar{\zeta}_\alpha - \bar{z}_\alpha) d\bar{\zeta}_\alpha \wedge d\zeta}{\left[\sum_{j=1}^n |\zeta_j - z_j|^m \right]^n} \right]$, 可称为拓广

的 B-M 核, 且 $m=2, 3, \dots, P, P < +\infty$; 而当 $m=2$ 时, 则变为通常的 B-M 核.

对 $K = (k_1, \dots, k_l) \in P(N)$, 定义: 若 k_1, \dots, k_l 两两不同, $U \frac{K}{D} := \{ \zeta \in U \bar{D}; \rho_{k_1}(\zeta) = \dots = \rho_{k_l}(\zeta) \}$; 否则, $U \frac{K}{D} := 0$.

由局部 q -凸楔形的定义^[10] 可知, $U \frac{K}{D}$ 为一个闭的 C^2 子流形. 记定义在 $U \frac{K}{D}$ 上的函数 ρ_K 满足

$$\rho_K(\zeta) = \rho_{k_r}(\zeta), \quad \zeta \in U \frac{K}{D}, \quad r = 1, \dots, l.$$

对于 $K \in P(N)$, 定义

$$\Gamma_K = \{ \zeta \in U \frac{K}{D}; \rho_j(\zeta) \leq \rho_K(\zeta) \leq 0, j = 1, \dots, N \},$$

则不难验证 Γ_K 为 \bar{D} 的 C^2 子流形, 具有逐块 C^2 边界, 而且有

$$\bar{D} = \Gamma_1 \cup \dots \cup \Gamma_N, \quad \partial \Gamma_K = S_K \cup \Gamma_{k_1} \cup \dots \cup \Gamma_{k_l}, \quad K \in P(N).$$

选择 Γ_K 的方向, 使得定向关于 K 的分量是斜对称的, 且 $\Gamma_1, \dots, \Gamma_N$ 具有 C^n 的定向, 若 $K \in P(N)$.

$1 \leq j \leq N, j \notin K$, 则 Γ_{kj} 的定向与 $-\partial\Gamma_k$ 的定向是一致的.

引理 2^[10] $\sum_{K \in P(N)} (-1)^{|K|} \partial(\Gamma_K \times \Delta_{0,K}) = \bar{D} \times \Delta_0 + \sum_{K \in P(N)} (-1)^{|K|} S_K \times \Delta_{0,K} - \sum_{K \in P(N)} \Gamma_K \times \Delta_K.$

选取 $\lambda_k \in C^\infty(\theta_k), k=1, \dots, N$, 使得在 $N(\rho_k)$ 的某邻域上 $\lambda_k(\zeta) = 1$. 由式(1), (3)可推出, 对每个 $z \in D$, 存在 $N(\rho_k)$ 的邻域 $V_k \subset \theta_k$, 使得对 $\zeta \in (D \cap \theta_k) \cup V_k$ 有 $\Phi_k(z, \zeta) \neq 0$. 因为 $\text{supp } \lambda_k \subset \subset \theta_k$, 所以对每一固定的 $z \in D$, 映射 $\lambda_k(\zeta) s_k^*(z, \zeta) / \Phi_k(z, \zeta)$ 关于 $\zeta \in D \cup V_k$ 是 C^1 的. 令

$$t^{(m)} = \lambda_0 g_\alpha^{(m)} + \sum_{k \in K} \lambda_k \frac{\lambda_k(\zeta) s_k^*(z, \zeta)}{\Phi_k(z, \zeta)}, \tag{8}$$

则其微分形式 $\Omega(t^{(m)}) = \frac{(n-1)!}{(2\pi i)^n} (\sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} t_k^{(m)} \bar{\partial} t_1^{(m)} \wedge \dots \wedge [k] \wedge \dots \wedge \bar{\partial} t_n^{(m)}) \wedge d\zeta$ 在 $D \times \partial D \times \Delta$ 的某一邻域 $\subset D \times M \times \Delta$ 上是连续的. 记 $Q(t^{(m)}) = \bar{\partial}\Omega(t^{(m)})$, 由此可得

引理 3^[12] $d_{\zeta, \lambda} [f(\zeta) \wedge \Omega(t^{(m)})] = \bar{\partial} f(\zeta) \wedge \Omega(t^{(m)}) + (-1)^q f(\zeta) \wedge Q(t^{(m)}) - \bar{\partial} [f(\zeta) \wedge \Omega(t^{(m)})].$

引理 4^[12] $\Omega(E^{(m)})|_{\Delta_0} = \Omega(t^{(m)})|_{\Delta_0} = \bar{\omega}^{(m)}(\zeta - z, \bar{\zeta} - \bar{z}).$

引理 5 如果 $\zeta \in \partial D$, 则 $\Omega(E^{(m)}) = \Omega(t^{(m)})$.

证明 若 $\zeta \in \partial D$, 则 $\lambda_k(\zeta) = 1, \Phi_k(z, \zeta) = \Phi_k(z, \zeta)$, 从而 $\frac{\lambda_k(\zeta) s_k^*(z, \zeta)}{\Phi_k(z, \zeta)} = \frac{s_k^*(z, \zeta)}{\Phi_k(z, \zeta)}$. 故由式(7)可以得到 $E^{(m)}|_{\zeta \in \partial D} = t^{(m)}|_{\zeta \in \partial D}$. 于是, $\Omega(E^{(m)})|_{\zeta \in \partial D} = \Omega(t^{(m)})|_{\zeta \in \partial D}$, 引理 5 成立.

引理 6 当 $z \in D$ 时, 对 \bar{D} 上连续有界 $(0, q)$ 形式 f 有 (1) $\int_{\Gamma_K \times \Delta_K} f(\zeta) \wedge \Omega(t^{(m)}) = 0, q \neq 1;$ (2)

$$\bar{\partial}_z \int_{\Gamma_K \times \Delta_K} f(\zeta) \wedge \Omega(t^{(m)}) = 0.$$

证明 若 $(\zeta, \lambda) \in \Gamma_K \times \Delta_K, t^{(m)} = \sum_{k \in K} \lambda_k \lambda_k s_k^*(z, \zeta) / \Phi_k(z, \zeta)$, 由于 $s_k^*(z, \zeta), \Phi_k(z, \zeta), (k=1, \dots, N)$ 关于 z 全纯, $\Omega(t^{(m)})|_{(\zeta, \lambda) \in \Gamma_K \times \Delta_K}$ 中关于 $\bar{\partial}_z$ 是 0 次的, 故 $f(\zeta) \wedge \Omega(t^{(m)})$ 中关于 ζ 与 λ 的次数和是 $2n+1-q, \dim^R(\Gamma_K \times \Delta_K) = 2n$ 如果 $q \neq 1$, 那么引理 6 的形式(1)中的积分一定为零.

由于 $s_k^*(z, \zeta), \Phi_k(z, \zeta) (k=1, \dots, N)$ 关于 z 全纯, 引理 6 的形式(2)成立, 则引理 6 成立.

2 定理及证明

定理 1 假设 $D \subset \subset C^n$ 是具有非光滑边界的强拟凸域, 并且 D 具有全纯支撑函数 $\Phi_k(z, \zeta), \Phi_k(z, \zeta), (k=1, \dots, N)$, 满足式(1)~(5)和条件(VD), $f \in C(0, q)(\bar{D}), \bar{\partial}f$ 也在 \bar{D} 连续, $1 \leq q \leq n$, 那么

$$f(z) = \sum_{|K| \leq n-q} (-1)^{|K|} \int_{\Gamma_K \times \Delta_{0,K}} \bar{\partial} f(\zeta) \wedge Q_{0,q}(t^{(m)}) + \sum_{|K| \leq n-q+1} (-1)^{|K|} \bar{\partial}_z \int_{\Gamma_K \times \Delta_{0,K}} f(\zeta) \wedge Q_{0,q-1}(t^{(m)}), \quad z \in D. \tag{9}$$

证明 不妨先证明特殊情况. 设当 $\zeta \in \partial D, d\rho_k(\zeta) \neq 0, (k=1, \dots, N)$, 而且 $f, \bar{\partial}f$ 在 \bar{D} 上连续. 在 $\sum_{K \in P(N)} (-1)^{|K|} \Gamma_K \times \Delta_{0,K}$ 上对微分形式 $f(\zeta) \wedge \Omega_{0,q-1}(t^{(m)})$ 运用 Stokes 公式得

$$\sum_{K \in P(N)} (-1)^{|K|} \int_{\Gamma_K \times \Delta_{0,K}} d_{\zeta, \lambda} [f(\zeta) \wedge \Omega_{0,q-1}(t^{(m)})] = \sum_{K \in P(N)} (-1)^{|K|} \int_{\alpha \Gamma_K \times \Delta_{0,K}} f(\zeta) \wedge \Omega_{0,q-1}(t^{(m)}).$$

由引理 2, 3 有

$$\begin{aligned} & \sum_{K \in P(N)} (-1)^{|K|} \int_{\Gamma_K \times \Delta_{0,K}} \bar{\partial} f(\zeta) \wedge \Omega_{0,q-1}(t^{(m)}) + (-1)^q \sum_{K \in P(N)} (-1)^{|K|} \int_{\Gamma_K \times \Delta_{0,K}} f(\zeta) \wedge Q_{0,q-1}(t^{(m)}) + \\ & \sum_{K \in P(N)} (-1)^{|K|} \bar{\partial}_z \int_{\Gamma_K \times \Delta_{0,K}} f(\zeta) \wedge \Omega_{0,q-2}(t^{(m)}) = \int_{\bar{D} \times \Delta_0} f(\zeta) \wedge \Omega_{0,q-1}(t^{(m)}) + \\ & \sum_{K \in P(N)} (-1)^{|K|} \int_{S_K \times \Delta_{0,K}} f(\zeta) \wedge \Omega_{0,q-1}(t^{(m)}) - \sum_{K \in P(N)} \int_{\Gamma_K \times \Delta_{0,K}} f(\zeta) \wedge \Omega_{0,q-1}(t^{(m)}). \end{aligned}$$

于是有

$$\sum_{K \in P(N)} (-1)^{|K|} \int_{\Gamma_K \times \Delta_{0,K}} f(\zeta) \wedge Q_{0,q-1}(t^{(m)}) = (-1)^q \int_{\bar{D} \times \Delta_0} f(\zeta) \wedge \Omega_{0,q-1}(t^{(m)}) +$$

$$\begin{aligned} & \sum_{K \in P(N)} (-1)^{|K|} \int_{S_K \times \Delta_{0,K}} f(\zeta) \wedge \Omega_{q, q-1}(t^{(m)}) + \\ & (-1)^{q+1} \left[\sum_{K \in P(N)} (-1)^{|K|} \bar{\partial}_z \int_{\Gamma_K \times \Delta_{0,K}} f(\zeta) \wedge \Omega_{0, q-2}(t^{(m)}) + \right. \\ & \left. \sum_{K \in P(N)} \int_{\Gamma_K \times \Delta_K} f(\zeta) \wedge \Omega_{0, q-1}(t^{(m)}) + \sum_{K \in P(N)} (-1)^{|K|} \int_{\Gamma_K \times \Delta_{0,K}} \bar{\partial}_z f(\zeta) \wedge \Omega_{0, q-1}(t^{(m)}) \right]. \end{aligned} \quad (10)$$

用 $\bar{\partial}_z$ 作用式(10)两边, 可得到

$$\begin{aligned} & \sum_{K \in P(N)} (-1)^{|K|} \bar{\partial}_z \int_{\Gamma_K \times \Delta_{0,K}} f(\zeta) \wedge \Omega_{0, q-1}(t^{(m)}) = (-1)^q \bar{\partial}_z \left[\int_{\bar{D} \times \Delta_0} f(\zeta) \wedge \Omega_{0, q-1}(t^{(m)}) + \right. \\ & \left. \sum_{K \in P(N)} (-1)^{|K|} \int_{S_K \times \Delta_{0,K}} f(\zeta) \wedge \Omega_{0, q-1}(t^{(m)}) \right] + (-1)^{q+1} \bar{\partial}_z \left[\sum_{K \in P(N)} \int_{\Gamma_K \times \Delta_K} f(\zeta) \wedge \Omega_{0, q-1}(t^{(m)}) + \right. \\ & \left. \sum_{K \in P(N)} (-1)^{|K|} \int_{\Gamma_K \times \Delta_{0,K}} \bar{\partial}_z f(\zeta) \wedge \Omega_{0, q-1}(t^{(m)}) \right]. \end{aligned} \quad (11)$$

在式(10)中用 $\bar{\partial}_z f(\zeta)$ 代换 $f(\zeta)$, 可得到

$$\begin{aligned} & \sum_{K \in P(N)} (-1)^{|K|} \int_{\Gamma_K \times \Delta_{0,K}} \bar{\partial}_z f(\zeta) \wedge \Omega_{0, q}(t^{(m)}) = (-1)^{q+1} \left[\int_{\bar{D} \times \Delta_0} \bar{\partial}_z f(\zeta) \wedge \Omega_{0, q}(t^{(m)}) + \right. \\ & \left. \sum_{K \in P(N)} (-1)^{|K|} \int_{S_K \times \Delta_{0,K}} \bar{\partial}_z f(\zeta) \wedge \Omega_{0, q}(t^{(m)}) \right] + \\ & (-1)^q \left[\sum_{K \in P(N)} (-1)^{|K|} \bar{\partial}_z \int_{\Gamma_K \times \Delta_{0,K}} \bar{\partial}_z f(\zeta) \wedge \Omega_{0, q-1}(t^{(m)}) + \sum_{K \in P(N)} \int_{\Gamma_K \times \Delta_K} \bar{\partial}_z f(\zeta) \wedge \Omega_{0, q}(t^{(m)}) \right]. \end{aligned} \quad (12)$$

由 $q \geq 1$ 及引理 6 可知

$$\begin{aligned} & \int_{\Gamma_K \times \Delta_K} \bar{\partial}_z f(\zeta) \wedge \Omega(t^{(m)}) = 0, \\ & \bar{\partial}_z \int_{\Gamma_K \times \Delta_K} f(\zeta) \wedge \Omega(t^{(m)}) = 0. \end{aligned}$$

把式(11), (12)相加可以得到

$$\begin{aligned} & \sum_{K \in P(N)} (-1)^{|K|} \int_{\Gamma_K \times \Delta_{0,K}} \bar{\partial}_z f(\zeta) \wedge \Omega_{0, q}(t^{(m)}) + \sum_{K \in P(N)} (-1)^{|K|} \bar{\partial}_z \int_{\Gamma_K \times \Delta_{0,K}} f(\zeta) \wedge \Omega_{0, q-1}(t^{(m)}) = \\ & (-1)^q \bar{\partial}_z \left[\int_{\bar{D} \times \Delta_0} f(\zeta) \wedge \Omega_{0, q-1}(t^{(m)}) + \sum_{K \in P(N)} (-1)^{|K|} \int_{S_K \times \Delta_{0,K}} f(\zeta) \wedge \Omega_{0, q-1}(t^{(m)}) \right] + \\ & (-1)^{q+1} \left[\int_{\bar{D} \times \Delta_0} \bar{\partial}_z f(\zeta) \wedge \Omega_{0, q}(t^{(m)}) + \sum_{K \in P(N)} (-1)^{|K|} \int_{S_K \times \Delta_{0,K}} \bar{\partial}_z f(\zeta) \wedge \Omega_{0, q}(t^{(m)}) \right]. \end{aligned} \quad (13)$$

另外, 由引理 4.5 可知

$$\begin{aligned} \Omega(E^{(m)})|_{\Delta_0} &= \Omega(t^{(m)})|_{\Delta_0} = \bar{\omega}^{(m)}(\zeta - z, \bar{\zeta} - \bar{z}), \\ \Omega(E^{(m)})|_{\mathbb{k} \in \partial D} &= \Omega(t^{(m)})|_{\mathbb{k} \in \partial D}. \end{aligned}$$

当 $|K| > n - q$ 时, $\dim_{\mathbb{R}} S_K = 2n - |K| < n + q$, 而 $f(\zeta) \wedge \Omega_{0, q-1}$ 关于 ζ 的次数 $\geq n + q$, 故有

$$\int_{S_K \times \Delta_{0,K}} f(\zeta) \wedge \Omega_{0, q-1} = 0, \quad |K| > n - q. \quad (14)$$

同理可得

$$\int_{S_K \times \Delta_{0,K}} \bar{\partial}_z f(\zeta) \wedge \Omega_{0, q} = 0, \quad |K| > n - q - 1, \quad (15)$$

$$\int_{\Gamma_K \times \Delta_{0,K}} \bar{\partial}_z f(\zeta) \wedge \Omega_{0, q-1} = 0, \quad |K| > n - q + 1, \quad (16)$$

$$\int_{\Gamma_K \times \Delta_{0,K}} \bar{\partial}_z f(\zeta) \wedge \Omega_{0, q} = 0, \quad |K| > n - q. \quad (17)$$

由式(13)~(17)及 Koppelman-Leray-Norguet 公式的拓广式(引理 1)可知, 式(9)在 $d^0_k(\zeta) \neq 0, \zeta \in \mathcal{D}$ 时成立. 其次, 考虑一般情况, 即不假设当 $\zeta \in \partial D$ 时, 有 $d^0(k) \neq 0, k=1, \dots, N$. 在这种情况下, 可以通过考虑一系列无限逼近 D 的强拟凸域 D_ν 来证明定理, 而本节所有的构造关于 ν 都是一致收敛的. 由此, 定理 1 的可证.

由定理 1, 只要做适当假设即可得

推论 1 在定理 1 条件下, 若 $f \in C^{(0,q)}(\bar{D})$, $\bar{\partial}f=0$, $1 \leq q \leq n$, 则有

$$g(z) = \sum_{|K| \leq n-q+1} (-1)^{|K|} \int_{\Gamma_K \times \Delta_{0,K}} f(\zeta) \wedge Q_{0,q-1}(t^{(m)}),$$

是 D 上 $\bar{\partial}g=f$ 的连续解.

参考文献:

- [1] HENKIN G M. Integral representations of holomorphic functions in strictly pseudoconvex domains and applications [J] . Mat Sb, 1969, 78: 611-632.
- [2] HENKIN G M. Integral representations of functions in strictly pseudoconvex domains and applications to the $\bar{\partial}$ -problem [J] . Mat Sb, 1970, 82: 300-308.
- [3] GRAUERT H, LIEB L. Das Ramirezsche integral und die Lösung der gleichung $\bar{\partial}f = \alpha$ im bereich der beschri nkten formen [J] . Proc Conf Complex Analysis, 1970, 56: 29-50.
- [4] KOPPELMAN W. The Cauchy integral for differential forms [J] . Bull Amer Soc, 1967, 73: 554-556.
- [5] HENKIN G M, LEITERER J. Theory of function on complex manifolds [M] . Berlin: Birkhäuser Verlag, 1984.
- [6] RANGE R M. Holomorphic functions and integral representations in several complex variables [M] . New York: Springer-Verlag, 1986.
- [7] 钟同德, 黄 沙. 多元复分析 [M] . 石家庄: 河北教育出版社, 1990.
- [8] RANGE R M, SIU Y T. Uniform Estimates for the $\bar{\partial}$ -equation on domains with piecewise smooth strictly pseudoconvex boundaries [J] . Math Ann, 1973(206): 325-354.
- [9] 姜 永. C^n 空间中具有逐块光滑边界的有界域上 K-L-N 公式的拓广式 [J] . 厦门大学学报: 自然科学版, 2007, 45(6): 746-749.
- [10] LAURENT-THIEBAUT C, LEITERER J. Uniform estimates for the Cauchy-Riemann equation on q -convex wedges [J] . Ann Inst Fourier (Grenoble), 1993, 43(2): 383-436.
- [11] 陈吕萍. C^n 中具有逐块光滑边界的有界域上带权因子积分表示的拓广式 [J] . 数学学报, 2006, 5: 1113-1120.
- [12] 邱春晖, 林良裕. Stein 流形上具有非光滑边界的带权因子的 Koppelman-Leray 公式 [J] . 厦门大学学报: 自然科学版, 1999, 37(1): 11-16.

Extension Formula of Koppelman-Leray-Norguet Formula on a Strictly Pseudoconvex Domain with Non-Smooth Boundary in C^n Space

LI Zhi-wei¹, CHEN Te-qing²

(1. Department of Mathematics, Quanzhou Normal University, Quanzhou 362000, China;

2. School of Mathematical Sciences, Xiamen University, Xiamen 361005, China)

Abstract: By means of Γ_K manifolds introduced by Laurent-Thiebaut, et al, we constructed extend B-M (Bochner-Matelli) kernel to study extension formula of Koppelman-Leray-Norguet formula and obtained a continuous solutions of $\bar{\partial}$ -equation on a strictly pseudoconvex domain with non-smooth boundary in C^n space. Our method does not involve integral on boundary that can avoid the complexity estimations of the boundary integrals.

Keywords: strictly pseudoconvex domain; non-smooth boundary; Koppelman-Leray-Norguet formula; extension formula; $\bar{\partial}$ -equation

(责任编辑: 陈志贤 英文审校: 张金顺 黄心中)